

TALAJÁNAK TEGYEN JÓT!



Galdorf

2376 Hernád, Köztársaság út 92.

+36 30 665 3134

PILLANGÓS KEVERÉK

- ◆ tavaszi bükköny 20% ◆ alexandriai here 32%
- ◆ fekete zab 48%

Javasolt vetőmagmennyiség: 20 kg/ha

- ◆ gyomelnyomó hatás ◆ N-megkötés
- ◆ talaj szervesanyag tartalom növelés ◆ erózió csökkentés (szél és víz)
- ◆ talaj termőképesség javító hatás ◆ talajlazító hatás
- ◆ könnyen kifagyó komponensek ◆ keresztesvirágú mentes keverék

TISZTA PILLANGÓS KEVERÉK

- ◆ bíborhere 70% ◆ alexandriai here 30%

Javasolt vetőmagmennyiség: 15 kg/ha

- ◆ tisztán pillangós komponensek ◆ kimagasló mértékű N-fixálás ◆ talaj-termőképesség javító hatás
- ◆ erózió csökkentés (szél és víz) ◆ könnyű bedolgozás ◆ talaj termőképesség javító hatás
- ◆ talajlazító hatás ◆ alacsony talajnedvesség csökkenés ◆ keresztesvirágú mentes keverék

VESSZEN PILLANGÓS KEVERÉKET!

VETÉSI IDŐ

◆ A gabona betakarítása után a zöldtrágyanövényeknek 6-7 hétre van szükségük jó csapadékviszonyok mellett, hogy megfelelő fejlettséget érjenek. Nagyon fontos a betakarítás utáni mielőbbi vetés, mert ahogy mondani szokták: „Egy júliusi jól időzített vetés, többet ér, mint egy 1 hét augusztusi jó idő vagy akár az egész szeptember!”

TALAJELŐKÉSZÍTÉS

◆ A hasznosítás irányától függetlenül, a zöldtrágya pozitív hatásainak kihasználásához szükség van a termesztéstechnológiai elemek gondos betartására. Ez pedig már az előveteménynél elkezdődik. Fontos, hogy a talaj felszínén a szármagmaradványok egyenletesen helyezkedjenek el, ne maradjanak nagy halmok a táblán. Az ezt követő talajmunka a talaj állapotától és az időjárási körülményektől függ.

◆ A tömörödött keréknyomokat és egyéb tömörödött talajfoltokat fel kell lazítani. Azt, hogy ekével, vagy forgatás nélküli technológiával végezzük a talajművelést, függ a talajállapottól, időjárástól és az egyéb üzemi sajátosságoktól. Amennyiben a zöldtrágya előtt történt forgatásos művelés, akkor a következő növény alá nem szükséges azt elvégezni. Nagy előnye a forgatásnak, hogy az árvakelés problémáját megoldja. Fontos, hogy a zöldtrágya növények mielőbbi kelését elő tudjuk segíteni, mert így az árvakelés hatékonyan elnyomható. Az árvakelés és a gyomok elnyomásában nagy szerepe van a megfelelő csíraszámoknak is.

Néhány kg/ha vetőmagdózistól ne várjunk csodát!

VETŐÁGY

◆ A jellemzően használt vetőmagok kicsi mérete miatt javasolt a 2-3 cm mélységre történő vetés. Az apró magok esetében fontos a megfelelő simaságú talaj kialakítása. Fontos a jó visszatömörítés és a vízkapillárisok megfelelő lezárása.

TRÁGYÁZÁS

◆ Alapvetően nem szükséges, de ha mégis történik kijuttatás, akkor figyeljünk rá, hogy az ország szántóterületeinek nagyobb része nitrátérzékeny, ezért ügyeljünk a határértékek és a jó mezőgazdasági gyakorlatok betartására!

A ZÖLDTRÁGYA BEDOLGOZÁSA

◆ A köztesnövények termesztése akkor sikeres, ha a területen rövid idő alatt nagy tömegű biomassza és gyökértömeg fejlődik. Fontos, hogy a visszamaradó zöldtrágya ne befolyásolja hátrányosan a következő főnövényt (pl. a keresztesvirágúak problémaköre).

TERMESZTÉSI JAVASLATOK

FONTOS MEGEMLÍTENI,
HOGY A ZÖLDÍTÉS CÉLJÁRA VETETT ÖKOLÓGIAI MÁSODVETÉSEKEN
TILOS A NÖVÉNYVÉDŐSZER HASZNÁLAT!

